

# MEN'S Health

メンズヘルス



## QOL疾患



百瀬 均 名誉院長

協力/平尾病院  
 榎原市兵部町6-28  
 ☎0744・24・4700

すぐに命にかかわるわけではありませんが、生活の質(QOL)に大きな影響を与える排尿障害。放っておくと大きな病気になるなど、日常生活に大きくかかります。男性の原因として多い前立腺肥大症について、平尾病院の百瀬均名誉院長(62)に聞きました。

# 排尿障害を考える

## 前立腺肥大症

### 60代で半数が自覚 排尿に関する症状

60代で約半数、70代で約70%の人が、何らかの排尿に関する症状を持っているといわれています。下部尿路症、いわゆる排尿障害には3種類の症状があります。まず、尿を出すときに感じる「出しにくい」などの症状。次に、尿意を頻繁に感じたり、尿失禁などの蓄尿症状。また、残尿感など排尿後の症状です。中でも蓄尿症状はいつ起こるか分からない症状で、QOLに一番影響を与えます。排尿障害にはさまざまな原因がありますが、中でも男性特有の前立腺肥大症はすべての症

状の原因になります。苦痛感じれば受診を命にかかわる病気にも

増え、進行すると尿閉という尿が出なくなることになります。そのま

もありません。困り具合は異なります。QOL疾患であるう

ついで何らかの苦痛を感じれば、泌尿器科の受診を考えましょう。

手術によって閉塞している部分を取り除くことにより、膀胱に

手術によって閉塞している部分を取り除くことにより、膀胱に

手術によって閉塞している部分を取り除くことにより、膀胱に

手術によって閉塞している部分を取り除くことにより、膀胱に

手術によって閉塞している部分を取り除くことにより、膀胱に

手術によって閉塞している部分を取り除くことにより、膀胱に

### 【図】前立腺肥大症によって起こること

#### ①尿道閉塞


尿が出にくくなる・途中で止まるなど

#### ②蓄尿症状

膀胱が過敏になり頻尿になる

#### ③尿閉

膀胱の働きが落ち、残尿が増えた結果。放っておくと腎不全に



手術によって閉塞している部分を取り除くことにより、膀胱に

手術によって閉塞している部分を取り除くことにより、膀胱に

手術によって閉塞している部分を取り除くことにより、膀胱に

手術によって閉塞している部分を取り除くことにより、膀胱に

手術によって閉塞している部分を取り除くことにより、膀胱に

手術によって閉塞している部分を取り除くことにより、膀胱に

手術によって閉塞している部分を取り除くことにより、膀胱に

手術によって閉塞している部分を取り除くことにより、膀胱に

手術によって閉塞している部分を取り除くことにより、膀胱に

手術によって閉塞している部分を取り除くことにより、膀胱に

手術によって閉塞している部分を取り除くことにより、膀胱に

手術によって閉塞している部分を取り除くことにより、膀胱に

手術によって閉塞している部分を取り除くことにより、膀胱に

手術によって閉塞している部分を取り除くことにより、膀胱に